

【目次】 悪性胸膜中皮腫

最終確認日:2024年3月1日

[①CDDP+PEM](#)

[②PEM](#)

[③ニボルマブ](#)

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 悪胸膜中皮腫
レジメン名: ①CDDP+PEM
() クール目

@PATIENTNAME 様

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペムトレキセド注(PEM)	500mg/m ²	mg	10分間DIV	Day1
シスプラチン注(CDDP)	75mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
パンビタン末	1g 1×		経口投与	Day1-21 ^{※1}
メチコバル注	1mg(2A)		筋肉内注射	3クールごとに1回 ^{※2}

※1 1クール目の7日以上前よりパンビタン末は内服開始すること。

ペムトレキセド注中止の場合は最終点滴日より22日目までパンビタン末を投与。

※2 1クール目の7日以上前に1回目のメチコバル筋注を行うこと。

●Day1

- ①メチコバル注500 μ g 2A(筋肉内注射) ←※3クールごとに1回
- ②ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ③生食 500mL (120分)
- ④ペムトレキセド注+生食100mL (10分)
- ⑤生食 500mL + 硫酸Mg補正液8mEq (120分)
- ⑥シスプラチン注+生食 計600mL (120分)
- ⑦フロセミド注20mg+生食 50mL (全開)
- ⑧ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑨ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑩ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:悪胸膜中皮腫

レジメン名: ②PEM

() クール目

●レジメン:1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペムトレキセド注(PEM)	500mg/m ²	mg	10分間DIV	Day1
パンビタン末	1g 1×		経口投与	Day1-21 ^{※1}
メチコバル注	1mg(2A)		筋肉内注射	3クールごとに1回 ^{※2}

※1 1クール目の7日以上前よりパンビタン末は内服開始すること。

ペムトレキセド注中止の場合は最終点滴日より22日目までパンビタン末を投与。

※2 1クール目の7日以上前に1回目のメチコバル筋注を行うこと。

●Day1

①メチコバル注500 μg2A(筋肉内注射)←※3クールごとに1回

②デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

③ペムトレキセド注+生食100mL (10分)

④生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:悪胸膜中皮腫
レジメン名:③ニボルマブ
() クール目

●レジメン:1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

- ①オプジーボ注 + 生食100mL (30分)
- ②生食50mL (全開)

備考: