

- [①FOLFIRI](#)
- [②FOLFIRI+BmabBS](#)
- [③FOLFIRI+Cmab](#)
- [④FOLFIRI+Pmab](#)
- [⑤IRIS](#)
- [⑥IRIS+BmabBS](#)
- [⑨mFOLFOX6](#)
- [⑩mFOLFOX6+BmabBS](#)
- [⑪mFOLFOX6+Pmab](#)
- [⑫CapOX](#)
- [⑬CapOX+BmabBS](#)
- [⑭CPT-11](#)
- [⑯CPT-11+Pmab](#)
- [⑰Cmab\(毎週\)](#)
- [⑱Pmab](#)
- [⑲SOX](#)
- [⑳SOX+BmabBS](#)
- [㉑5-FU+ℓ-LV\(3投1休\)](#)
- [㉒5-FU+ℓ-LV\(6投2休\)](#)
- [㉓5-FU+ℓ-LV\(6投2休\)+BmabBS](#)
- [㉔IRIS+Cmab](#)
- [㉕CapIri](#)
- [㉖CapIri+BmabBS](#)
- [㉗mFOLFOXIRI](#)
- [㉘mFOLFOXIRI\(維持\)](#)
- [㉙mFOLFOXIRI+BmabBS](#)
- [㉚mFOLFOXIRI+BmabBS\(維持\)](#)
- [㉛UFT+LV+BmabBS](#)
- [㉜S1+BmabBS](#)
- [㉝Cape+BmabBS](#)
- [㉞FOLFIRI+Rmab](#)
- [㉟TAS-102+BmabBS](#)
- [㊱FOLFIRI+Aflibercept](#)
- [㊲SIR\(triweekly IRIS\)](#)
- [㊳SIRB\(triweekly IRIS+BmabBS\)](#)
- [㊴CPT-11+Cmab](#)
- [㊵ペムプロリズマブ](#)
- [㊶C-mab+エンコラフェニブ+ヒニメチニブ](#)
- [㊷C-mab+エンコラフェニブ](#)
- [㊸ニボルマブ\(2週毎\)](#)
- [㊹ニボルマブ+イピリムマブ](#)
- [㊺ニボルマブ\(4週毎\)](#)
- [㊻HP](#)

※欠番があります。

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ①FOLFIRI

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
レボホリナート注(ℓ-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ④フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑤フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②FOLFIRI+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ベバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
レボホリナート注(LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②ベバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑤フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑥フルオロウラシル注+生食 計115mL (2.5mL/hr) 但し、5-FU ≤ 5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月4日改訂

氏名

適応疾患: 大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③FOLFIRI+Cmab

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アービタックス注(Cmab)	500mg/m ²	mg	120分間DIV ^{※1}	Day1
レボホリナート注(LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は60分間まで短縮できる。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポラミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②アービタックス注+生食 計600mL (120又は60分⇒経過観察60又は30分)
- ③生食50mL (経過観察用)
- ④レボホリナート注mg+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ⑤イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ⑥フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑦フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ④FOLFIRI+Pmab

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ベクティビックス注(Pmab)	6mg/kg	mg	60分間DIV	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②生食50mL(フラッシュ用)
- ③ベクティビックス注+生食100 mL (60分)
- ④生食50mL(フラッシュ用)
- ⑤レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ⑥イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑦フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑧フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑤IRIS

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
イリノテカン注(CPT-11)	100mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1,15
S-1	80mg/m ² *1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day15

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)

●Day16

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day17

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day18

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ⑥IRIS+BmabBS

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1,15
イリノテカン注(CPT-11)	100mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1,15
S-1	80mg/m ² ※3	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)

④生食50mL (全開)

⑤S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day15

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)

④生食50mL (全開)

●Day16

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day17

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day18

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑨mFOLFOX6

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
レボホリナート注(ℓ-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ④フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑤フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑩mFOLFOX6+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ベバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②ベバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑤フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑥フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑪mFOLFOX6+Pmab

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ベクティビックス注(Pmab)	6mg/kg	mg	60分間DIV	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②生食50mL(フラッシュ用)
- ③ベクティビックス注+生食100 mL (60分)
- ④生食50mL(フラッシュ用)
- ⑤レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ⑥オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑦フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑧フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん
レジメン名: ⑫CapOX
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
カペシタビン錠(Cape)	2000mg/m ² *1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

*1 Cape投与量(C法:1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③5%ブドウ糖液50mL (全開)
- ④カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ⑬CapOX+BmabBS

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	7.5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
カペシタビン錠(Cape)	2000mg/m ² ^{※3}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 Cape投与量(C法:1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)

④5%ブドウ糖液50mL (全開)

⑤カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑭CPT-11

() クール目

●レジメン: 1クール35日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
イリノテカン注(CPT-11)	100mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+生食250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day8

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+生食250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)

●Day9

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day10

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day11

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day15

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+生食250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)

●Day16

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day17

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day18

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑩CPT-11+Pmab

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペクティビックス注(P-mab)	6mg/kg	mg	60分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②生食50mL(フラッシュ用)
- ③ペクティビックス注+生食100mL (60分)
- ④生食50mL(フラッシュ用)
- ⑤イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ⑥生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年10月24日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑰Cmab(毎週)

() クール目

●レジメン: 1クール35日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アービタックス注(Cmab)	400mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1 ^{※1}
アービタックス注(Cmab)	250mg/m ²	mg	60分間DIV	Day8,15,22,29

※1 2クール目以降は、250mg/m² 60分間DIV

●Day1

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②アービタックス注+生食 計600又は250 mL (120又は60分⇒経過観察 60又は30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②アービタックス注+生食250mL (60分⇒経過観察30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②アービタックス注+生食250mL (60分⇒経過観察30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day22

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②アービタックス注+生食250mL (60分⇒経過観察30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day29

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②アービタックス注+生食250mL (60分⇒経過観察30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月22日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:大腸がん
レジメン名: ⑱Pmab
() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ベクティビックス注(Pmab)	6mg/kg	mg	60分間DIV	Day1

●Day1

- ①ベクティビックス注+生食100mL(60分)
- ②生食50mL(全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ①SOX

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² *1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③5%ブドウ糖液50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②SOX+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	7.5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² ^{※3}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)

④5%ブドウ糖液50mL (全開)

⑤S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ②15-FU+①LV(3投1休)

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
レボホリナート注(①-LV)	250mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1,8,15
フルオロウラシル注(5-FU)	600mg/m ²	mg	5分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3m+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ②5-FU+②-LV(6投2休)

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール56日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
レボホリナート注(②-LV)	250mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1,8,15,22,29,36
フルオロウラシル注(5-FU)	600mg/m ²	mg	5分間DIV	Day1,8,15,22,29,36

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day22

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day29

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day36

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

適応疾患: 大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ㊸5-FU+㊸LV(6投2休)+BmabBS
() クール目

●レジメン: 1クール56日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1,15,29,43
レボホリナート注(㊸LV)	250mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1,8,15,22,29,36
フルオロウラシル注(5-FU)	600mg/m ²	mg	5分間DIV	Day1,8,15,22,29,36

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day22

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day29

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day36

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③フルオロウラシル注+生食50mL (②投与開始60分後から5分間)
- ④生食50mL (全開)

●Day43

- ②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ④生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月4日改訂

氏名

適応疾患: 大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②IRIS+Cmab

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アービタックス注(Cmab)	500mg/m ²	mg	120分間DIV ^{※1}	Day1,15
イリノテカン注(CPT-11)	100mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1,15
S-1	80mg/m ² ※2	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は60分間まで短縮できる。

※2 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②アービタックス注+生食 計600mL (120又は60分⇒経過観察 60又は30分)
- ③生食50mL (経過観察用)
- ④イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ⑤生食50mL (全開)
- ⑥S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day15

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②アービタックス注+生食 計600mL (120又は60分⇒経過観察 60又は30分)
- ③生食50mL (経過観察用)
- ④イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day16

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day17

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day18

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ㊸CapIri

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
イリノテカン注(CPT-11)	200mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1
カペシタビン錠(Cape)	1600mg/m ² *1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

*1 Cape投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.31m ² 未満	900mg	1,800mg
1.31m ² 以上1.69m ² 未満	1,200mg	2,400mg
1.69m ² 以上2.07m ² 未満	1,500mg	3,000mg
2.07m ² 以上	1,800mg	3,600mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)
- ④カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②⑥CapIri+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	7.5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	200mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1
カペシタビン錠(Cape)	1600mg/m ² ^{※3}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 Cape投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.31m ² 未満	900mg	1,800mg
1.31m ² 以上1.69m ² 未満	1,200mg	2,400mg
1.69m ² 以上2.07m ² 未満	1,500mg	3,000mg
2.07m ² 以上	1,800mg	3,600mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ④生食50mL (全開)
- ⑤カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月20日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②7mFOLFOXIRI

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑤フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU ≤ 5750mg

●Day2

- ①デキサメタゾン錠8mg

●Day3

- ①デキサメタゾン錠8mg

●Day4

- ①デキサメタゾン錠8mg

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ②8mFOLFOXIRI(維持)

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
レボホリナート注(ℓ-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)

③フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月20日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②9mFOLFOXIRI+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
 - ②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
 - ③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
 - ④レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
 - ⑤オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
 - ⑥フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU \leq 5750mg
- } 同時投与

●Day2

- ①デキサメタゾン錠8mg

●Day3

- ①デキサメタゾン錠8mg

●Day4

- ①デキサメタゾン錠8mg

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ③0mFOLFOXIRI+BmabBS(維持)

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)

④フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU \leq 5750mg

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③①UFT+LV+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1,15
テガフル・ウラシル 顆粒/カプセル(UFT)	300mg/m ² ^{※3}	mg	経口投与 ^{※4}	Day1午後-22午前
ホリナート錠(LV)	75mg/body	mg	経口投与 ^{※4}	Day1午後-22午前

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 UFT投与量(1日3回)

体表面積	1回用量	午前	午後	夜間
1.17m ² 未満	300mg	100mg	100mg	100mg
1.17m ² 以上1.50m ² 未満	400mg	200mg	100mg	100mg
1.50m ² 以上1.83m ² 未満	500mg	200mg	200mg	100mg
1.83m ² 以上	600mg	200mg	200mg	200mg

※4 UFTおよびLVは、8時間毎かつ食事の前後60分間をさけて内服すること。

●Day1

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

③UFT+LV (Day1午後-15午前)

●Day15

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

③UFT+LV (Day1午後-15午前)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③S1+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール42日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1,15,29
S-1	80mg/m ² ※3	mg	経口投与	Day1夕-29朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

③S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day15

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

③S-1 (Day15夕食後-29朝食後)

●Day29

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ③③Cape+BmabBS

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	7.5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
カペシタビン錠(Cape)	2000mg/m ² ※3	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 Cape投与量(C法:1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

③カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③④FOLFIRI+Rmab

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
サイラムザ注(Rmab)	8mg/kg	mg	60分間DIV ^{※1}	Day1
レボホリナート注(ℓ-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間で行っても良い。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ポララミン注5mg
+生食100mL (30分)
 - ②サイラムザ注+生食250 mL (30-60分)
 - ③生食50mL (全開)
 - ④レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
 - ⑤イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
 - ⑥フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
 - ⑦フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU ≤ 5750mg
- } 同時投与

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③⑤TAS-102+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1,15
ロンサーフ配合錠(TAS-102)	下記参照 ^{※3}	mg	経口投与	Day1夕-6朝, Day8夕-13朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 ロンサーフ配合錠投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.07m ² 未満	35mg	70mg
1.07m ² 以上1.23m ² 未満	40mg	80mg
1.23m ² 以上1.38m ² 未満	45mg	90mg
1.38m ² 以上1.53m ² 未満	50mg	100mg
1.53m ² 以上1.69m ² 未満	55mg	110mg
1.69m ² 以上1.84m ² 未満	60mg	120mg
1.84m ² 以上1.99m ² 未満	65mg	130mg
1.99m ² 以上2.15m ² 未満	70mg	140mg
2.15m ² 以上	75mg	150mg

●Day1

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

③ロンサーフ配合錠 (Day1夕食後-6朝食後、Day8夕食後-13朝食後)

●Day15

①ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③⑥FOLFIRI+Aflibercept

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ザルトラップ注(Afl)	4mg/kg	mg	60分間DIV	Day1
レボホリナート注(L-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②ザルトラップ注+生食100 mL (60分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑤フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑥フルオロウラシル注+生食 計115mL (2.5mL/hr) 但し、5-FU ≤ 5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ③⑦SIR(triweekly IRIS)

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² *1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ③生食50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③⑧SIRB (triweekly IRIS+BmabBS)
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペバシズマブBS注(BmabBS)	7.5mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1,2}	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² ※3	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

※3 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②ペバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)

③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)

④生食50mL (全開)

⑤S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●Day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月4日改訂

氏名

適応疾患:大腸がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③⑨CPT-11+Cmab

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アービタックス注(Cmab)	500mg/m ²	mg	120分間DIV ^{※1}	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は60分間まで短縮できる。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②アービタックス注+生食 計600mL (120又は60分⇒経過観察60又は30分)
- ③生食50mL (経過観察用)
- ④イリノテカン注+生食250mL (90分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月22日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:大腸がん
レジメン名: ④0ペムブロリズマブ
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	200 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

- ①キイトルーダ注+生食100mL (30分)
- ②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年10月24日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ④1C-mab+インコラフェニブ+ビニメチニブ
() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アービタックス注(Cmab)	500mg/m ²	mg	120分間DIV ^{※1}	Day1
ビラフトビカプセル	300mg/body	mg	経口投与	Day1-14
メクトビ錠	90mg/body	mg	経口投与	Day1-14

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は60分間まで短縮できる。

●Day1

- ①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②アービタックス注+生食 計600mL (120又は60分⇒経過観察 60又は30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④ビラフトビカプセル (Day1-14)
- ⑤メクトビ錠 (Day1-14)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年10月24日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ④C-mab+インコラフェニブ

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アービタックス注(Cmab)	500mg/m ²	mg	120分間DIV ^{※1}	Day1
ビラフトビカプセル	300mg/body	mg	経口投与	Day1-14

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は60分間まで短縮できる。

●Day1

①デキサメタゾン注6.6mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)

②アービタックス注+生食 計600mL (120又は60分⇒経過観察 60又は30分)

③生食50mL (全開)

④ビラフトビカプセル (Day1-14)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年5月2日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ④3ニボルマブ(2週毎)

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年1月4日作成

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ④④ニボルマブ+イピリムマブ

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1
ヤーボイ注	1mg/kg	mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分⇒経過観察30分)

②ヤーボイ注+生食30mL (30分)

③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年5月2日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ④ニボルマブ(4週毎)

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	480mg/body	480 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年8月20日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:大腸がん

レジメン名: ④HP

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
パージェタ注(PER)	840mg/body	mg	60分間DIV	Day1(初回)
パージェタ注(PER)	420mg/body	mg	60分間DIV ^{※1}	Day1(2回目以降)
ハーセプチン注(Tmab)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day1(初回)
ハーセプチン注(Tmab)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day1(2回目以降)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

●Day1

- ①パージェタ注+生食250mL (30分-60分)
- ②ハーセプチン注+生食250mL (30分-90分)
- ③生食50mL (全開)

備考: