

- [①CDDP+CPT-11](#)
- [②CDDP+VNR](#)
- [③CDDP+GEM](#)
- [④CDDP+PEM](#)
- [⑤CBDCA+CPT-11](#)
- [⑥CBDCA+GEM](#)
- [⑦CBDCA+PTX](#)
- [⑧CBDCA+PEM](#)
- [⑨CBDCA+PTX+BmabBS](#)
- [⑩CBDCA+GEM+BmabBS](#)
- [⑪DOC\(3投1休\)](#)
- [⑫DOC\(3週毎\)](#)
- [⑬GEM](#)
- [⑭VNR](#)
- [⑮BmabBS維持療法](#)
- [⑯PEM](#)
- [⑰GEM+VNR](#)
- [⑱CBDCA+S-1](#)
- [⑲DOC+RAM](#)
- [⑳ニボルマブ](#)
- [㉑ペムブロリズマブ](#)
- [㉒アテゾリズマブ](#)

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ①CDDP+CPT-11
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注 (CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注 (CPT-11)	60mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①生食500mL (120分)
- ②生食500mL + 硫酸Mg補正液8mEq (120分)
- ③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ④シスプラチン注+生食 計600mL (120分)
- ⑤イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ⑥ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑦ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑧ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

●Day8

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

@PATIENTNAME様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ②CDDP+VNR
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
ビノレルビン注(VNR)	25mg/m ²	mg	全開DIV	Day1,8

●Day1

①生食500mL (120分)

②生食500mL + 硫酸Mg補正液8mEq (120分)

③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)

④シスプラチン注+生食 計600mL (120分)

⑤ビノレルビン注+生食50mL (全開)

⑥ソルアセトF 500mL (120分)

⑦ソルアセトF 500mL (120分)

⑧ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

①ソルアセトF 500mL (120分)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソルアセトF 500mL (120分)

③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

①ソルアセトF 500mL (120分)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソルアセトF 500mL (120分)

③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

●Day8

①ビノレルビン注+生食50mL (全開)

②YDソリタ-T3号輸液200mL (30分)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ③CDDP+GEM
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8

●Day1

- ①生食500mL (120分)
- ②生食500mL + 硫酸Mg補正液8mEq (120分)
- ③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ④シスプラチン注+生食 計600mL (120分)
- ⑤ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ⑥ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑦ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑧ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

●Day8

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除く)
レジメン名: ④CDDP+PEM
() クール目

@PATIENTNAME様

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペムトレキセド注(PEM)	500mg/m ²	mg	10分間DIV	Day1
シスプラチン注(CDDP)	75mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
パンプタン末	1g 1×		経口投与	Day1-21 ^{※1}
メチコバル注	1mg(2A)		筋肉内注射	3クールごとに1回 ^{※2}

※1 1クール目の7日以上前よりパンプタン末は内服開始すること。
ペムトレキセド注中止の場合は最終点滴日より22日目までパンプタン末を投与。
※2 1クール目の7日以上前に1回目のメチコバル筋注を行うこと。

●Day1

①メチコバル注500 μ g 2A(筋肉内注射)←※3クールごとに1回
②ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
③生食 500mL (120分)
④ペムトレキセド注+生食100mL (10分)
⑤生食 500mL + 硫酸Mg補正液8mEq(120分)
⑥シスプラチン注+生食 計600mL (120分)
⑦フロセミド注20mg+生食 50mL (全開)
⑧ソルアセトF 500mL (120分)
⑨ソルアセトF 500mL (120分)
⑩ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

①ソルアセトF 500mL (120分)
側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
②ソルアセトF 500mL (120分)
③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

①ソルアセトF 500mL (120分)
側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
②ソルアセトF 500mL (120分)
③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 非小細胞肺癌

レジメン名: ⑤CBDCA+CPT-11

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
カルボプラチン注(CBDCA)	AUC=6	mg	60分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	60mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②カルボプラチン注+生食250mL (60分)
- ③イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ④生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day8

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌
レジメン名: ⑥CBDCA+GEM
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
カルボプラチン注(CBDCA)	AUC=5	mg	60分間DIV	Day1
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②カルボプラチン注+生食250mL (60分)
- ③ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ④生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌
レジメン名: ⑦CBDCA+PTX
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
パクリタキセル注 (PTX)	200mg/m ²	mg	180分間DIV	Day1
カルボプラチン注 (CBDCA)	AUC=6	mg	60分間DIV	Day1

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg
+ポラミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液500mL (180分)
- ③カルボプラチン注+生食250mL (60分)
- ④生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)
 レジメン名: ⑧CBDCA+PEM
 () クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペトレキセド注(PEM)	500mg/m ²	10分間DIV	mg	Day1
カルボプラチン注(CBDCA)	AUC=5	60分間DIV	mg	Day1
パニタニド末	1g 1×	経口投与		Day1-21 ^{※1}
メチコバール注	1mg(2A)	筋肉内注射		3クールごとに1回 ^{※2}

※1 1クール目の7日以上前よりパニタニド末は内服開始すること。

ペトレキセド注中止の場合は最終点滴日より22日目までパニタニド末を投与。

※2 1クール目の7日以上前に1回目のメチコバール筋注を行うこと。

●Day1

- ①メチコバール注500 μ g 2A (筋肉内注射) ←※3クールごとに1回
- ②ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食 100mL (30分)
- ③ペトレキセド注+生食 100mL (10分)
- ④カルボプラチン注 +生食 250mL (60分)
- ⑤生食 50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)
レジメン名: ⑨CBDCA+PTX+BmabBS
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
パクリタキセル注(PTX)	200mg/m ²	mg	180分間DIV	Day1
カルボプラチン注(CBDCA)	AUC=6	mg	60分間DIV	Day1
ベバシズマブBS注(BmabBS)	15mg/kg		90分間DIV※1,2	Day1

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポラミン注5mg+生食100mL (30分)
- ③パクリタキセル注+5%ブドウ糖液500mL (180分)
- ④カルボプラチン注+生食250mL (60分)
- ⑤ベバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ⑥生食 50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑩CBDCA+GEM+BmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
カルボプラチン注(CBDCA)	AUC=5	mg	60分間DIV	Day1
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8
ベバシズマブBS注(BmabBS)	15mg/kg	mg	90分間DIV※1,2	Day1

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目の投与は60分間で行っても良い。

※2 2回目の投与においても忍容性が良好であれば、それ以降の投与は30分間投与とする。

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②カルボプラチン注+生食250mL (60分)
- ③ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ④ベバシズマブBS注+生食100mL (30-90分)
- ⑤生食 50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ⑪DOC(3投1休)
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	20mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食100mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食100mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食100mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ⑫DOC(3週毎)
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	60mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌
レジメン名: ⑬GEM
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年7月31日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ⑭VNR
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ビノレルビン注(VNR)	25mg/m ²	mg	全開DIV	Day1,8

●Day1

- ①ビノレルビン注+生食50mL (全開)
- ②YDソリタ-T3号輸液200mL (30分)

●Day8

- ①ビノレルビン注+生食50mL (全開)
- ②YDソリタ-T3号輸液200mL (30分)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年4月19日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)
レジメン名: ⑮BmabBS維持療法
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ベバシズマブBS注(BmabBS)	15mg/kg	mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①ベバシズマブBS注+生食100mL(30分)

②生食 50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)
 レジメン名: ⑩PEM
 () クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ペメトレキセド注(PEM)	500mg/m ²	mg	10分間DIV	Day1
パニタニール末	1g 1×		経口投与	Day1-21 ^{※1}
メチコバル注	1mg(2A)		筋肉内注射	3クールごとに1回 ^{※2}

※1 1クール目の7日以上前よりパニタニール末は内服開始すること。

ペメトレキセド注中止の場合は最終点滴日より22日目までパニタニール末を投与。

※2 1クール目の7日以上前に1回目のメチコバル筋注を行うこと。

●Day1

- ①メチコバル注500 μ g2A(筋肉内注射)←※3クールごとに1回
- ②デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ③ペメトレキセド注+生食100mL (10分)
- ④生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ⑪GEM+VNR
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8
ビノレルビン注(VNR)	25mg/m ²		全開DIV	Day1,8

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③ビノレルビン注+生食50mL (全開)
- ④YDソリタ-T3号輸液200mL (30分)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③ビノレルビン注+生食50mL (全開)
- ④YDソリタ-T3号輸液200mL (30分)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ⑩CBDCA+S-1
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
カルボプラチン注 (CBDCA) S-1	AUC=5 80mg/m ² *1	mg mg	60分間DIV 経口投与	Day1 Day1夕-15朝

*1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食 100mL (30分)
- ②カルボプラチン注 +生食 250mL (60分)
- ③生食 50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後~15朝食後)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
 レジメン名: ①⑨DOC+RAM
 () クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	60mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1
サイラムザ注(RAM)	10mg/kg	mg	60分間DIV※1	Day1

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間で行っても良い。

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ⑤生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月16日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ②⑩ニボルマブ
() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注 + 生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月16日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ②①ペムブロリズマブ
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	200 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①キイトルーダ注 + 生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月16日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 非小細胞肺がん
レジメン名: ②②アテゾリズマブ
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
テセントリク注	1200mg/body	1200 mg	60分間DIV ^{※1}	Day1

※1初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

●Day1

- ①テセントリク注 + 生食250mL (30-60分)
- ②生食50mL (全開)

備考: