

- [①SP](#)
 - [②SP+TmabBS](#)
 - [③XP](#)
 - [④XP+TmabBS](#)
 - [⑥DCS](#)
 - [⑦PTX](#)
 - [⑧PTX+TmabBS](#)
 - [⑨nab-PTX\(3週毎\)](#)
 - [⑩DOC](#)
 - [⑪CPT-11](#)
 - [⑫DOC+S-1](#)
 - [⑭nab-PTX+TmabBS](#)
 - [⑮SOX](#)
 - [⑯CapOX](#)
 - [⑰PTX+RAM](#)
 - [⑲RAM](#)
 - [⑳ニボルマブ\(2週毎\)](#)
 - [㉑nab-PTX\(3投1休\)](#)
 - [㉒nab-PTX+RAM](#)
 - [㉓FP+TmabBS](#)
 - [㉔CapOX+TmabBS](#)
 - [㉕ニボルマブ+SOX](#)
 - [㉖SOX+TmabBS](#)
 - [㉗ニボルマブ\(4週毎\)](#)
 - [㉘CapOX+ゾルヘツキシマブ](#)
 - [㉙mFOLFOX6+ゾルヘツキシマブ](#)
- ※欠番があります。

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん
レジメン名: ①SP
() クール目

@PATIENTNAME

様

●レジメン: 1クール35日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
S-1 シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ² *1 60mg/m ²	mg mg	経口投与 120分間DIV	Day1夕-22朝 Day8

*1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①S-1 (Day1夕食後-22朝食後)

●Day7

①ソルアセットF 500mL (120分)

②ソルアセットF 500mL (120分)

●Day8

①ソルアセットF500mL (90分)

②ソルアセットF500mL+硫酸Mg補正液8mEq (90分)

③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)

④シスプラチン注+生食計600mL (120分)

⑤ソルアセットF500mL (90分)

⑥ソルアセットF500mL (90分)

⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (翌朝まで)

●Day9

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソルアセットF 500mL (120分)

③ソルアセットF 500mL (120分)

●Day10

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソルアセットF 500mL (120分)

③ソルアセットF 500mL (120分)

●Day11

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②SP+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
トラスツズマブBS注(TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day2(初回)
トラスツズマブBS注(TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day2(2回目以降)
S-1	80mg/m ² ^{※2}	mg	経口投与	Day2夕-16朝
シスプラチン注(CDDP)	60mg/m ²	mg	120分間DIV	Day2

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

※2 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①ソルアセトF 500mL (120分)

②ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

①ソルアセトF500mL (90分)

②ソルアセトF500mL+硫酸Mg補正液8mEq (90分)

③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)

④トラスツズマブBS注+生食250mL(30分-90分)

⑤シスプラチン注+生食計600mL (120分)

⑥ソルアセトF500mL (90分)

⑦ソルアセトF500mL (90分)

⑧YDソリタ-T3号輸液500mL (翌朝まで)

⑨S-1 (Day2夕食後-16朝食後)

●Day3

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソルアセトF 500mL (120分)

③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソルアセトF 500mL (120分)

③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day5

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん
レジメン名: ③XP
() クール目

@PATIENTNAME

様

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注 (CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day2
カペシタビン錠	2000mg/m ² *1	mg	経口投与	Day2夕-16朝

*1 Cape投与量 (C法: 1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

- ①ソルアセトF500mL (90分)
- ②ソルアセトF500mL+硫酸Mg補正液8mEq (90分)
- ③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ④シスプラチン注+生食計600mL (120分)
- ⑤ソルアセトF500mL (90分)
- ⑥ソルアセトF500mL (90分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (翌朝まで)
- ⑧カペシタビン錠 (Day2夕食後-16朝食後)

●Day3

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day5

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ④XP+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
トラスツズマブBS注(TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day2(初回)
トラスツズマブBS注(TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day2(2回目以降)
シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day2
カペシタビン錠	2000mg/m ² ^{※2}	mg	経口投与	Day2夕-16朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

※2 Cape投与量(C法:1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

①ソリアセトF 500mL (120分)

②ソリアセトF 500mL (120分)

●Day2

①ソリアセトF500mL (90分)

②ソリアセトF500mL+硫酸Mg補正液8mEq (90分)

③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)

④トラスツズマブBS注+生食250mL(30分-90分)

⑤シスプラチン注+生食計600mL (120分)

⑥ソリアセトF500mL (90分)

⑦ソリアセトF500mL (90分)

⑧YDソリタ-T3号輸液500mL (翌朝まで)

⑨カペシタビン錠 (Day2夕食後-16朝食後)

●Day3

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソリアセトF 500mL (120分)

③ソリアセトF 500mL (120分)

●Day4

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

②ソリアセトF 500mL (120分)

③ソリアセトF 500mL (120分)

●Day5

①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん
レジメン名: ⑥DCS
() クール目

@PATIENTNAME

様

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
S-1	80mg/m ² *1	mg	経口投与	Day2夕-16朝
ドセタキセル注(DOC)	40mg/m ²	mg	60分間DIV	Day2
シスプラチン注(CDDP)	60mg/m ²	mg	90分間DIV	Day2

*1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

- ①ソルアセトF500mL (90分)
- ②ソルアセトF500mL+硫酸Mg補正液8mEq (90分)
- ③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ④ドセタキセル注+5%ブドウ糖液250mL(60分)
- ⑤シスプラチン注+生食計600mL (90分)
- ⑥ソルアセトF500mL (90分)
- ⑦ソルアセトF500mL (90分)
- ⑧YDソリタ-T3号輸液500mL (翌朝まで)
- ⑨S-1 (Day2夕食後-16朝食後)

●Day3

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day5

- ①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん
レジメン名: ⑦PTX
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
パクリタキセル注(PTX)	80mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑧PTX+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール84日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
トラスツズマブBS注(TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day1(初回)
トラスツズマブBS注(TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day22,43,64(2回目以降)
パクリタキセル注(PTX)	80mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1,8,15,29,36,43,57,64,71

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

●Day1

- ①トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)
- ②デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ③パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ④生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day22

- ①トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)
- ②生食50mL (全開)

●Day29

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day36

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day43

- ①トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)
- ②デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ③パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ④生食50mL (全開)

●Day57

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day64

- ①トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)

- ②デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ③パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ④生食50mL (全開)

●Day71

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑨nab-PTX(3週毎)

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アブラキサン注(nab-PTX)	260mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)

③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 胃がん
レジメン名: ⑩DOC
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	60mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑪CPT-11

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1

●Day1

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②イリノテカン注+生食500mL (90分)

③生食50mL (全開)

●day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 胃がん
 レジメン名: ⑫DOC+S-1
 () クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ドセタキセル注(DOC)	40mg/m ²	mg	60分間DIV 経口投与	Day1
S-1	80mg/m ² *1	mg		Day1夕-15朝

*1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ドセタキセル注+生食250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑭ nab-PTX+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アブラキサン注(nab-PTX)	260mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1
トラスツズマブBS注(TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day1(初回)
トラスツズマブBS注(TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day1(2回目以降)

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)
- ⑤生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑮SOX

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オキサリプラチン注(L-OHP)	100mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² * ^{※1}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③5%ブドウ糖液50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑩CapOX

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
カペシタビン錠	2000mg/m ² *1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

*1 Cape投与量(C法:1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

②ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

②オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)

③5%ブドウ糖液50mL (全開)

④カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑰PTX+RAM

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
サイラムザ注(RAM)	8mg/kg	mg	60分間DIV ^{※1}	Day1,15
パクリタキセル注(PTX)	80mg/m ²	mg	60分間DIV	Day1,8,15

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間で行っても良い。

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ファモチジン注20mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④パクリタキセル注+5%ブドウ糖液250mL (60分)
- ⑤生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ①9RAM

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
サイラムザ注(RAM)	8mg/kg	mg	60分間DIV [^]	Day1,15

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間で行っても良い。

●Day1

- ①ポラミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①ポラミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2023年9月25日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ⑳ニボルマブ(2週毎)

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ② nab-PTX(3投1休)

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アブラキサン注(nab-PTX)	100mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8,15

●Day1

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)

③生食50mL (全開)

●Day8

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)

③生食50mL (全開)

●Day15

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)

③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ②nab-PTX+RAM

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
サイラムザ注(RAM)	8mg/kg	mg	60分間DIV ^{※1}	Day1,15
アブラキサン注(nab-PTX)	100mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8,15

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与は30分間で行っても良い。

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+ポララミン注5mg+生食50mL (15分)
- ②サイラムザ注+生食250mL (30-60分)
- ③生食50mL (全開)
- ④アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ⑤生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ②③FP+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
トラスツズマブBS注(TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day2(初回)
トラスツズマブBS注(TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day2(2回目以降)
フルオロウラシル注(5-FU)	800mg/m ²	mg	24時間DIV	Day2-6
シスプラチン注(CDDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day2

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

●Day1

①ソルアセトF注500mL(120分)

②ソルアセトF注500mL(120分)

●Day2

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①ソルアセトF注500mL(120分)

側管②ソルアセトF注500mL + 硫酸Mg補正液8mEq(120分)

側管③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg
+生食100mL(30分)

側管④トラスツズマブBS注+生食250mL(30分-90分)

側管⑤シスプラチン注+生食計600mL(120分)

側管⑥ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑦ソルアセトF注500mL(120分)

●Day3

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管②ソルアセトF注500mL(120分)

側管③ソルアセトF注500mL(120分)

側管④ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑤ソルアセトF注500mL(120分)

●Day4

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

側管②ソルアセトF注500mL(120分)

側管③ソルアセトF注500mL(120分)

側管④ソルアセトF注500mL(120分)

側管⑤ソルアセトF注500mL(120分)

●Day5

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

●Day6

①フルオロウラシル注+生食500mL(24時間)

側管①デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

備考:



《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②④CapOX+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
トラスツズマブBS注 (TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day1 (初回)
トラスツズマブBS注 (TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day1(2回目以降)
オキサリプラチン注 (L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
カペシタビン錠	2000mg/m ² ^{※2}	mg	経口投与	Day1 夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

※2 Cape投与量 (C法: 1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)
- ③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④5%ブドウ糖液50mL (全開)
- ⑤カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ②⑤ニボルマブ+SOX

@PATIENTNAME

様

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	360mg/body	360 mg	30分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	100mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² ※1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分)

②ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)

③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)

④5%ブドウ糖液50mL (全開)

⑤S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●day2

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day3

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day4

①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月30日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②6SOX+TmabBS

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
トラスツズマブBS注(TmabBS)	8mg/kg	mg	90分間DIV	Day1(初回)
トラスツズマブBS注(TmabBS)	6mg/kg	mg	90分間DIV ^{※1}	Day1(2回目以降)
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
S-1	80mg/m ² ^{※2}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 初回投与の忍容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。

※2 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.25m ² 未満	40mg	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	50mg	100mg
1.50m ² 以上	60mg	120mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②トラスツズマブBS注+生食250mL (30分-90分)
- ③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④5%ブドウ糖液50mL (全開)
- ⑤S-1 (Day1夕食後-15朝食後)

●day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考:

《化学療法レジメン》

2023年9月25日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ②⑦ニボルマブ(4週毎)

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	480mg/body	480 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年10月15日改訂

氏名

適応疾患: 胃がん

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑳CapOX+ゾルベツキシマフ

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ゾルベツキシマフ注	800mg/m ²	mg	120分以上DIV ^{※1}	Day1(初回)
ゾルベツキシマフ注	600mg/m ²	mg	120分以上DIV ^{※2}	Day1(2回目以降)
オキサリプラチン注(L-OHP)	130mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
カペシタビン錠	2000mg/m ² ^{※3}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 投与開始から30~60分後まで100mg/m²/hrで投与し、その後忍容性が良好であれば200~400mg/m²/hrで投与可

※2 投与開始から30~60分後まで75mg/m²/hrで投与し、その後忍容性が良好であれば150~300mg/m²/hrで投与可

※3 Cape投与量(C法: 1日2回)

体表面積	1回用量	1日用量
1.36m ²	1,200mg	2,400mg
1.36m ² 以上1.66m ² 未満	1,500mg	3,000mg
1.66m ² 以上1.96m ² 未満	1,800mg	3,600mg
1.96m ² 以上	2,100mg	4,200mg

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg
+ポララミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②ゾルベツキシマフ注+生食 (2mg/mL) (120分以上)
- ③オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④5%ブドウ糖液50mL (全開)
- ⑤カペシタビン錠 (Day1夕食後-15朝食後)

●day2

- ①デキサメタゾン錠8mg

●day3

- ①デキサメタゾン錠8mg

●day4

- ①デキサメタゾン錠8mg

備考:

《化学療法レジメン》

2024年10月15日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 胃がん

レジメン名: ②9mFOLFOX6+ゾルベツキシマフ

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ゾルベツキシマフ注	800mg/m ²	mg	120分以上DIV ^{※1}	Day1(初回)
ゾルベツキシマフ注	400mg/m ²	mg	120分以上DIV ^{※2}	Day1(2回目以降)
レボホリナート注(ℓ-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	400mg/m ²	mg	急速静注	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

※1 投与開始から30~60分後まで100mg/m²/hrで投与し、その後忍容性が良好であれば200~400mg/m²/hrで投与可

※2 投与開始から30~60分後まで50mg/m²/hrで投与し、その後忍容性が良好であれば100~200mg/m²/hrで投与可

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg
+ポララミン注5mg+生食100mL (30分)
- ②ゾルベツキシマフ注+生食 (2mg/mL) (120分以上)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ⑤フルオロウラシル注+生食50mL (全開)
- ⑥フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU ≤ 5750mg

●Day2

- ①デキサメタゾン錠8mg

●Day3

- ①デキサメタゾン錠8mg

●Day4

- ①デキサメタゾン錠8mg

備考: