

【目次】 腎細胞がん

最終確認日:2024年8月20日

[①ニボルマブ](#)

[②アベルマブ+アキシチニブ](#)

[③ペムプロリズマブ+アキシチニブ](#)

《化学療法レジメン》

2020年7月14日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患:腎細胞がん
レジメン名:①ニボルマブ
() クール目

●レジメン:1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+ 生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月16日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:腎細胞がん

レジメン名: ②アベルマブ+アキシチニブ

() クール目

●レジメン:1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
バベンチオ注	10mg/kg	mg	60分間DIV	Day1
アキシチニブ錠	10mg/日 ^{※1}	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 適宜増減するが、1回10mg1日2回まで増量できる。

●Day1⇒忍容性に問題がなければ、5回目以降①省略可

①アセトアミノフェン錠400mg+ポララミン錠2mg(②投与30-60分前)

②バベンチオ注+生食250mL(60分)

③生食50mL(全開)

④アキシチニブ錠(day1夕-15朝)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年8月20日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:腎細胞がん

レジメン名:③ペムブロリズマブ+アキシチニブ

() クール目

●レジメン:1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	200 mg	30分間DIV	Day1
アキシチニブ錠	10mg/日 ^{※1}	mg	経口投与	Day1夕-22朝

※1 適宜増減するが、1回10mg1日2回まで増量できる。

●Day1

①キイトルーダ注+生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考: