

- [①GN](#)
 - [②GC](#)
 - [③M-VAC](#)
 - [④MEC\(分割\)](#)
 - [⑤MEC](#)
 - [⑥ペムプロリズマブ](#)
 - [⑦GEM+CBDCA](#)
 - [⑭アベルマブ](#)
 - [⑮エンホルツマブ ベドチン](#)
 - [⑯ニボルマブ\(4週毎\)](#)
 - [⑰ニボルマブ\(2週毎\)](#)
 - [⑱ペムプロリズマブ+エンホルツマブ ベドチン](#)
- ※欠番があります。

《化学療法レジメン》

2022年10月24日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

レジメン名: ①GN

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アクブラ注(NDP)	80mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8

●Day1

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ④アクブラ注+生食500mL (120分)
- ⑤ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑦ソルアセトF 500mL (120分)

●Day2

- ①デキサメサゾン錠8mg
- ②ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

- ①デキサメサゾン錠8mg

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ②GC

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注(CDDP)	70mg/m ²	mg	120分間DIV	Day2
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL(全開)

●Day2

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②ソルアセトF 500mL + 硫酸Mg補正液8mEq (120分)
側管①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg
+生食100mL (30分)
- ③シスプラチン注+生食 計600mL (120分)
- ④フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑥プリンペラン注10mg+ソルアセトF500mL (120分)
- ⑦ソルアセトF注500mL(120分)

●Day3

- ①生食500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③ソルアセトF500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day4

- ①生食500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③ソルアセトF500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day5

- ①生食500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③ソルアセトF500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)

③生食50mL（全開）

備考：

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ③M-VAC

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
メソトレキセート注(MTX)	30mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,15,22
エクザール注(VLB)	3mg/m ²	mg	30分間DIV	Day2,15,22
アドリアシン注(ADM) ^{※1}	30mg/m ²	mg	30分間DIV	Day2
シスプラチン注(CDDP)	70mg/m ²	mg	4-6時間	Day2

※1 アドリアシン注の総投与量は500mg/m²以下

●Day1

①メイロン注7%20mL+ソルアセトF 500mL (120分)

①側管 メソトレキセート注+生食100mL(30分)

②ダイアモックス注500mg+ソルアセトF 500mL (120分)

③ソルアセトF 500mL (120分)

④メイロン注7%20mL+YDソリタ3号輸液500mL(120分)

⑤YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

①側管 ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了3時間後から投与

②側管 ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了9時間後から投与

③側管 ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了15時間後から投与

④側管 ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了260分間後から投与

●Day2

①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)

②ソルアセトF 500mL (120分)

側管① エクザール注+生食100mL (30分)

側管② アドリアシン注+生食100mL (30分)

③フロセミド注20mg+硫酸Mg補正液8mEq+5%ブドウ糖液 500mL (120分)

④シスプラチン注+生食 計600mL (120-180分) ※シスプラチンは半分量

側管① フロセミド注20mg+生食 50mL (30分)

⑤シスプラチン注+生食 計600mL (120-180分) ※シスプラチンは半分量

側管① フロセミド注20mg+生食 50mL (30分)

⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

⑦ソルアセトF 500mL (120分)

⑧YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day3

①フロセミド注20mg+ソルアセトF 500mL (180分)

②YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

③フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

④YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

●Day4

①フロセミド注20mg+ソルアセトF 500mL (180分)

②YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)

③フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

④YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

●Day5⇒食事量などに応じて漸減

①フロセミド注20mg+ソルアセトF 500mL (180分)

②YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

- 側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)
- ③フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120-180分)

●Day15

- ①メイロン注7%20mL+ソルアセトF 500mL (120分)
 - 側管① メソトレキセート注+生食100mL (30分)
 - 側管② エクザール注+生食100mL (30分)
- ②ダイアモックス注500mg +ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL(120分)
- ④メイロン注7%20mL+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
 - 側管① ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了3時間後から投与
 - 側管② ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了9時間後から投与
 - 側管③ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了15時間後から投与
 - 側管④ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了260分間後から投与

●Day22

- ①メイロン注7%20mL+ソルアセトF 500mL (120分)
 - 側管① メソトレキセート注+生食100mL (30分)
 - 側管② エクザール注+生食100mL (30分)
- ②ダイアモックス注500mg+ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL(120分)
- ④メイロン注7%20mL+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
 - 側管① ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了3時間後から投与
 - 側管② ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了9時間後から投与
 - 側管③ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了15時間後から投与
 - 側管④ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了260分間後から投与

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 尿路悪性腫瘍
レジメン名: ④MEC(分割)
() クール目

@PATIENTNAME

様

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
メソトレキセート(MTX)	30mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,15
エピルビシン注(EPI) ^{※1}	50mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1
シスプラチン(CDDP)	50mg/m ²	mg	2-3時間DIV	Day2,3

※1 エピルビシン注の総投与量が900mg/m²以上でうつ血性心不全のリスク増加

●Day1

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL(15分)
- ②メイロン注7%20mL+ソルアセトF 500mL (120分)
側管① メソトレキセート注+生食 50mL (30分)
側管② エピルビシン注+生食50mL(30分)
- ③ダイアモックス注500mg+ソルアセトF 500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑤メイロン注7%20mL+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑥YDソリタT3号輸液500mL (120分)
- ⑦YDソリタT3号輸液500mL (120分)
側管① ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了3時間後から投与
側管② ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了9時間後から投与
側管③ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了15時間後から投与
側管④ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了21時間後から投与

●Day2

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL+硫酸Mg補正液8mEq (120分)
- ③ホスネツピタント注235mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ④シスプラチン注+生食 計600mL (120-180分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食100mL (30分)
- ⑥ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑦YDソリタT3号輸液500mL (120分)
- ⑧ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

- ①ソルアセトF500mL(120分)
- ②YDソリタT3号輸液500mL+硫酸Mg補正液8mEq (120分)
- ③デキサメタゾン注9.9mg+生食50mL (15分)
- ④シスプラチン注+生食 計600mL (120-180分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食100mL (30分)
- ⑥ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑧ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②フロセミド注20mg+YDソリタ-3号輸液500mL(120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤ソルアセトF 500mL (120分)

●Day5

- ①ソルアセトF 500mL(120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL(120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL(120分)
- ⑤ソルアセトF 500mL(120分)

●Day6⇒食事量などに応じて③④中止

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)

●Day7⇒食事量などに応じて③④中止

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)

●Day15

- ①メイロン注7%20mL+ソルアセトF 500mL (120分)
側管① メソトレキセート注+生食50mL(30分)
- ②ダイアモックス注500mg+ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)
- ④メイロン注7%20mL+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
側管① ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了3時間後から投与
側管② ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了9時間後から投与
側管③ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了15時間後から投与
側管④ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了21時間後から投与

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日改訂

氏名

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

@PATIENTNAME

様

レジメン名: ⑤MEC

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
メトレキセート(MTX)	30mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,15
エピルビシン注(EPI) ^{※1}	50mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1
シスプラチン(CDDP)	100mg/m ²	mg	4-6時間	Day2

※1 エピルビシン注の総投与量が900mg/m²以上でうつ血性心不全のリスク増加

●Day1

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②メイロン注7%注20mL1A+ソルアセトF 500mL (120分)
側管① メトレキセート注+生食50mL (30分)
側管② エピルビシン注+生食50mL (30分)
- ③ダイアモックス注500mg+ソルアセトF500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑤メイロン注7%20mL+YDソリタ-T3号輸液 500mL (120分)
- ⑥YDソリタ-T3号輸液 500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液 500mL (120分)
側管① ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メトレキセート注終了3時間後から投与
側管② ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メトレキセート注終了9時間後から投与
側管③ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メトレキセート注終了15時間後から投与
側管④ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メトレキセート注終了21時間後から投与

●Day2

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL+硫酸Mg補正液8mEq (120分)
- ③ホスネツピタント注235mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ④シスプラチン注+生食 計600mL (120-180分) ※シスプラチンは半分量
- ⑤フロセミド注20mg+生食50mL (30分)
- ⑥シスプラチン+生食 計600mL (120-180分) ※シスプラチンは半分量
- ⑦フロセミド注20mg+生食50mL (30分)
- ⑧ソルアセトF 500mL (120分)
- ⑨YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑩ソルアセトF 500mL (120分)

●Day3

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤ソルアセトF 500mL (120分)

●Day4

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②フロセミド注20mg+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤ソルアセトF 500mL (120分)

●Day5

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- 側管① デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)

●Day6⇒食事量などに応じて③④中止

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)

●Day7⇒食事量などに応じて③④中止

- ①ソルアセトF 500mL (120分)
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ③YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ④ソルアセトF 500mL (120分)

●Day15

- ①メイロン注7%20mL+ソルアセトF 500mL (120分)
- 側管① メソトレキセート注+生食50mL (30分)
- ②ダイアモックス注500mg注+ソルアセトF 500mL (120分)
- ③ソルアセトF 500mL (120分)
- ④メイロン注7%20mL+YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑤YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- ⑥YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)
- 側管① ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了3時間後から投与
- 側管② ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了9時間後から投与
- 側管③ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了15時間後から投与
- 側管④ ロイコボリン注15mg+生食 50mL (30分) メソトレキセート注終了21時間後から投与

備考:

《化学療法レジメン》

2020年7月16日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍
レジメン名: ⑥ペムブロリズマブ
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	200 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

- ①キイトルーダ注+生食100mL (30分)
- ②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年10月24日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

レジメン名: ⑦GEM+CBDCA

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
カルボプラチン注(CBDCA)	AUC=5	mg	60分間DIV	Day1
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg
+生食100mL (30分)
- ②カルボプラチン注+生食250mL (60分)
- ③ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ④生食50mL (全開)

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day4

- ①(デキサメタゾン錠4mg) デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2021年3月12日作成

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍
レジメン名: ⑭アベルマブ
() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
バベンチオ注	10mg/kg	mg	60分間DIV	Day1

●Day1⇒忍容性に問題がなければ、5回目以降①省略可

①アセトアミノフェン錠400mg+ポララミン錠2mg(②投与30-60分前)

②バベンチオ注+生食250mL (60分)

③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年5月13日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

レジメン名: ⑮エンホルツマブ ベドチン

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
パドセブ注	1.25mg/kg ^{※1}	mg	30分間DIV	Day1,8,15

※1 1回量として125mgを超えないこと。

●Day1

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②パドセブ注+生食50mL (30分)

③生食50mL (全開)

●Day8

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②パドセブ注+生食50mL (30分)

③生食50mL (全開)

●Day15

①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

②パドセブ注+生食50mL (30分)

③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月16日作成

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍
レジメン名: ⑩ニボルマブ(4週毎)
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	480mg/body	480 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

- ①オプジーボ注+生食100mL (30分)
- ②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年3月1日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

レジメン名: ⑰ニボルマブ(2週毎)

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オプジーボ注	240mg/body	240 mg	30分間DIV	Day1

●Day1

①オプジーボ注+生食100mL (30分)

②生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2024年9月27日作成

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 尿路悪性腫瘍

レジメン名: ⑩ペムブロリズブ+エンホルツマブ ベドチン
() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
キイトルーダ注	200mg/body	200 mg	30分間DIV	Day1
パドセブ注	1.25mg/kg ^{※1}	mg	30分間DIV	Day1,8

※1 1回量として125mgを超えないこと。

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②パドセブ注+生食50mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④キイトルーダ注+生食100mL (30分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②パドセブ注+生食50mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考: