

- [①BEP](#)
- [②EP](#)

《化学療法レジメン》

2022年9月13日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:精巣腫瘍

レジメン名: ①BEP

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注 (CDDP)	20mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1-5
エトポシド注 (VP-16)	100mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1-5
ブレオマイシン注 (BLM)	30mg/body	mg	24時間DIV	Day1,8,15

●Day1

①ブレオマイシン注+生食500mL (24時間持続)

側管①アクメインD 500mL (120分)

側管②生食500mL (120分)

側管③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg
+生食100mL (30分)

側管④シスプラチン注+生食 500mL (120分)

側管⑤フロセミド注20mg + 生食 500mL (120分)

側管⑥エトポシド注+生食500mL (120分)

側管⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day2

①アクメインD500mL (120分)

②生食500mL (120分)

③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

④シスプラチン注+生食 500mL (120分)

⑤フロセミド注20mg + 生食 500mL (120分)

⑥エトポシド注+生食500mL (120分)

⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day3

①アクメインD 500mL (120分)

②生食500mL (120分)

③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

④シスプラチン注+生食 500mL (120分)

⑤フロセミド注20mg + 生食 500mL (120分)

⑥エトポシド注+生食500mL (120分)

⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day4

①アクメインD500mL (120分)

②生食500mL (120分)

③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

④シスプラチン注+生食 500mL (120分)

⑤フロセミド注20mg + 生食 500mL (120分)

⑥エトポシド注+生食500mL (120分)

⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day5

①アクメインD 500mL (120分)

②生食500mL (120分)

③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)

④シスプラチン注+生食 500mL (120分)

⑤フロセミド注20mg + 生食 500mL (120分)

- ⑥エトポシド注+生食500mL（120分）
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）

●Day6

- ①アクメインD500mL（120分）
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）
- ③フロセミド注20mg+アクメインD 500mL（120分）
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）

●Day7

- ①アクメインD500mL（120分）
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）
- ③フロセミド注20mg+アクメイン D500mL（120分）
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）

●Day8

- ①ブレオマイシン注+生食500mL（24時間持続）
- ②生食50mL（全開）

●Day15

- ①ブレオマイシン注+生食500mL（24時間持続）
- ②生食50mL（全開）

備考:

《化学療法レジメン》

2022年9月13日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患:精巣腫瘍

レジメン名: ②EP

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
シスプラチン注(CDDP)	20mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1-5
エトポシド注(VP-16)	100mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1-5

●Day1

- ①アクメインD500mL (120分)
- ②生食500mL (120分)
- ③ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ④シスプラチン注+生食 500mL (120分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食500mL (120分)
- ⑥エトポシド注+生食500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day2

- ①アクメインD500mL (120分)
- ②生食500mL (120分)
- ③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ④シスプラチン注+生食 500mL (120分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食 500mL (120分)
- ⑥エトポシド注+生食500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day3

- ①アクメインD500mL (120分)
- ②生食500mL (120分)
- ③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ④シスプラチン注+生食 500mL (120分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食 500mL (120分)
- ⑥エトポシド注+生食500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day4

- ①アクメインD500mL (120分)
- ②生食500mL (120分)
- ③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ④シスプラチン注+生食 500mL (120分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食500mL (120分)
- ⑥エトポシド注+生食500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day5

- ①アクメインD500mL (120分)
- ②生食500mL (120分)
- ③デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ④シスプラチン注+生食 500mL (120分)
- ⑤フロセミド注20mg+生食500mL (120分)
- ⑥エトポシド注+生食500mL (120分)
- ⑦YDソリタ-T3号輸液500mL (120分)

●Day6

- ①アクメインD500mL（120分）
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）
- ③フロセミド注20mg+アクメインD500mL（120分）
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）

●Day7

- ①アクメインD500mL（120分）
- ②YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）
- ③フロセミド注20mg+アクメインD500mL（120分）
- ④YDソリタ-T3号輸液500mL（120分）

備考: