

【目次】 膵がん

最終確認日:2025年5月20日

- [①GEM](#)
- [②GEM+S-1\(術前\)](#)
- [③mFOLFIRINOX](#)
- [④nab-PTX+GEM](#)
- [⑤nal-IRI+5-FU+ℓ-LV](#)

《化学療法レジメン》

2021年9月7日改訂

氏名

@PATIENTNAME 様

適応疾患: 膵がん
レジメン名: ①GEM
() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day8

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

●Day15

- ①デキサメタゾン注3.3mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2025年5月20日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 膵がん

レジメン名: ②GEM+S-1(術前)

() クール目

●レジメン: 1クール21日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8
S-1	下記参照※1	mg	経口投与	Day1夕-15朝

※1 S-1投与量(1日2回)

体表面積	1日用量
1.25m ² 未満	80mg
1.25m ² 以上1.50m ² 未満	100mg
1.50m ² 以上	120mg

●Day1

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④S-1 (Day1夕食後-8朝食後)

●Day8

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④S-1 (Day8夕食後-15朝食後)

備考:

《化学療法レジメン》

2025年5月20日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 膵がん

レジメン名: ③mFOLFIRINOX

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オキサリプラチン注(L-OHP)	85mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
レボホリナート注(ℓ-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
イリノテカン注(CPT-11)	150mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注9.9mg+生食100mL (30分)
- ②オキサリプラチン注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分) } 同時投与
- ④イリノテカン注+5%ブドウ糖液250mL (90分)
- ⑤フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU ≤ 5750mg
- ⑥オランザピン錠5mg

●Day2

- ①デキサメタゾン錠8mg+オランザピン錠5mg

●Day3

- ①デキサメタゾン錠8mg+オランザピン錠5mg

●Day4

- ①デキサメタゾン錠8mg+オランザピン錠5mg

備考:

《化学療法レジメン》

2025年3月18日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 膵がん

レジメン名: ④nab-PTX+GEM

() クール目

●レジメン: 1クール28日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
アブラキサン注(nab-PTX)	125mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8,15
ゲムシタビン注(GEM)	1000mg/m ²	mg	30分間DIV	Day1,8,15

●Day1

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day8

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ⑤生食50mL (全開)

●Day15

- ①パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注6.6mg+生食50mL (15分)
- ②アブラキサン注+アブラキサン1Vに対して生食20mL (30分)
- ③生食50mL (全開)
- ④ゲムシタビン注+5%ブドウ糖液100mL (30分)
- ⑤生食50mL (全開)

備考:

《化学療法レジメン》

2025年3月18日改訂

氏名

@PATIENTNAME

様

適応疾患: 膵がん

レジメン名: ⑤nal-IRI+5-FU+l-LV

() クール目

●レジメン: 1クール14日間

	投与量	実際の投与量	投与時間	投与日
オニバイド注(nal-IRI)	70mg/m ²	mg	90分間DIV	Day1
レボホリナート注(l-LV)	200mg/m ²	mg	120分間DIV	Day1
フルオロウラシル注(5-FU)	2400mg/m ²	mg	46時間DIV	Day1(-46時間)

●Day1

- ①ホスネツピタント注235mg+パロノセトロン注0.75mg+デキサメタゾン注3.3mg+生食100mL (30分)
- ②オニバイド注+5%ブドウ糖液500mL (90分)
- ③レボホリナート注+5%ブドウ糖液250mL (120分)
- ④フルオロウラシル注+生食 計115mL(2.5mL/hr) 但し、5-FU≤5750mg

●Day2

- ①(デキサメタゾン錠4mg)デキサメタゾンは処方されない場合があります。

●Day3

- ①(デキサメタゾン錠4mg)デキサメタゾンは処方されない場合があります。

備考: